DOCUMENT D'INFORMATION À DESTINATION DES PATIENTS

MODALITÉS D'UTILISATION DU STYLO **Wegovy®** (sémaglutide)

Retrouvez la vidéo de démonstration du stylo Wegovy® en flashant ce code

FR23SEMO00047 - Novembre 2024

novo nordisk®

Votre médecin vous a prescrit Wegovy®.
Ce guide vous aidera à utiliser correctement le stylo prérempli.

Il complète les instructions fournies par votre médecin et celles de la notice du médicament. Avant de vous administrer le médicament pour la première fois, lisez et suivez ces instructions attentivement. N'utilisez pas le stylo sans avoir été formé par un professionnel de santé qualifié.

Si vous avez des questions ou des doutes, contactez votre médecin, pharmacien ou infirmier/ère. Ce guide vous rappellera les étapes importantes. Conservez-le car vous pourriez avoir besoin de le relire.

Ce guide ne remplace pas la notice du médicament, qui contient des informations essentielles telles que les indications, les contre-indications, les effets indésirables potentiels, et les précautions spécifiques.

Pour plus d'informations, consultez la notice présente dans la boîte de votre médicament ou consultez la base de données publique des médicaments : http://base-donnees-publique.medicaments.gouv.fr

SOMMAIRE

I. Qu'est-ce que Wegovy® ? Comment l'utiliser ? **04**
1. Les dosages de Wegovy® et contenu de la boîte
2. Description du stylo Wegovy®
3. Comment utiliser Wegovy® ?

II. Comment se préparer à l'injection ? Vérification du stylo **06**

III. Instruction pour l'administration **07**
1. Préparez le stylo en y connectant une nouvelle aiguille
2. Vérifiez l'écoulement de chaque nouveau stylo
3. Sélectionnez la dose prescrite
4. Choisissez et préparez le site d'injection
5. Procédez à l'injection
6. Après l'injection

IV. Élimination des déchets **12**

V. Informations importantes **13**

VI. Que faire en cas d'effet indésirable ? **14**

VII. Planning des injections **16**

VIII. Questions fréquentes **22**

1 Les dosages de Wegovy® et contenu de la boîte.

Wegovy® existe en 5 dosages, 1 stylo par dosage :
0,25 mg, 0,5 mg, 1 mg, 1,7 mg et 2,4 mg.

Chaque boite contient 1 stylo pré-rempli, 4 aiguilles NovoFine® Plus jetables et la notice de Wegovy®.

1 stylo pré-rempli contient 4 doses, soit 4 semaines de traitement à raison d'une injection par semaine.

2 Description du stylo Wegovy®, représenté avec son capuchon retiré.



Exemple **d'aiguille NovoFine® Plus**



3 Comment utiliser Wegovy® ?

Suivez scrupuleusement les indications de votre médecin concernant le dosage, la fréquence et la durée du traitement.

- Wegovy® doit être administré par injection **sous la peau** (injection sous-cutanée) ;
- **1 dose/semaine (le même jour si possible) ;**
- Au cours ou en dehors des repas, quel que soit le moment de la journée.
- Inscrire le jour de la semaine choisi pour l'injection sur la boîte du stylo.
- Si nécessaire, vous pouvez changer le jour de votre injection hebdomadaire, à condition que votre dernière injection ait eu lieu au moins 3 jours auparavant. Après la sélection d'un nouveau jour d'administration, poursuivez l'injection une fois par semaine.

N'utilisez pas le stylo sans avoir été préalablement formé par votre médecin, pharmacien ou infirmier/ère. Interrogez-les si vous n'êtes pas sûr d'avoir compris l'ensemble de la procédure.

II. COMMENT SE PRÉPARER À **L'INJECTION ?** **VÉRIFICATION** DU STYLO

Avant de débuter l'injection, vérifiez toujours que :

Vous avez le bon médicament et le dosage prescrit : vérifiez l'etiquette du stylo Wegovy® pour vous assurer qu'il s'agit du bon médicament et au dosage prescrit par votre médecin.

La date de péremption : vérifiez la date indiquée sur le stylo ou sur son emballage. N'utilisez pas le stylo si cette date est dépassée.

L'intégrité du stylo : n'utilisez pas le stylo s'il semble avoir été utilisé ou endommagé, par exemple s'il est tombé ou a été conservé de manière incorrecte *(voir le chapitre « Questions fréquentes » Comment savoir si l'aiguille de mon stylo Wegovy® est bouchée ou endommagée ?).*

L'aspect de la solution : examinez la solution au travers de la fenêtre du stylo. Elle doit être limpide et incolore. Si elle est trouble ou colorée, n'utilisez pas le stylo.

La conservation : n'utilisez pas le stylo, s'il a été congelé ou exposé à la lumière direct du soleil.

Entretenez correctement le stylo *(voir le chapitre « Questions fréquentes » Comment bien entretenir le stylo ?).* **Une mauvaise manipulation ou utilisation peut entraîner des erreurs de dosage.**

Contactez votre médecin ou votre infirmier/ère si vous suspectez un problème avec le stylo.

III. INSTRUCTION POUR **L'ADMINISTRATION**

1 Préparez le stylo en y connectant une nouvelle aiguille

Retirez le capuchon du stylo.

Vérifiez que la solution dans le stylo est limpide et incolore. Regardez au travers de la fenêtre du stylo. Si Wegovy® est trouble ou coloré, n'utilisez pas le stylo.

Utilisez toujours une nouvelle aiguille pour chaque injection.

Vérifiez que l'opercule de papier et le capuchon extérieur de l'aiguille ne présentent pas de dommages. Si l'un des deux est endommagé, la stérilité de l'aiguille pourrait être compromise. Eliminez-la alors et utilisez-en une nouvelle.

Retirez l'opercule de papier.



Poussez l'aiguille sur le stylo. Tournez-la jusqu'à ce qu'elle soit en place.
L'aiguille est protégée par **deux capuchons**. Vous devez retirer les deux.
Si vous oubliez de les retirer, vous ne serez pas en mesure d'injecter Wegovy®.

Retirez le capuchon exterieur de l'aiguille et **conservez-le.** Vous en aurez besoin pour retirer l'aiguille du stylo en toute sécurité après l'injection.

Retirez le capuchon intérieur de l'aiguille et jetez-le. Une goutte de Wegovy® peut apparaître au niveau d'extrémité de l'aiguille.

Utilisez toujours une aiguille neuve avant chaque injection et n'utilisez jamais une aiguille pliée ou endommagée.

2 Vérifiez l'écoulement de chaque nouveau stylo.

Si le stylo a déjà été utilisé, passez directement à l'étape 3 « Sélectionnez la dose prescrite ».

Attention, contrôlez l'écoulement uniquement lors de la 1ère utilisation du stylo.

Tournez le sélectionneur de dose jusqu'à ce que le symbole de contrôle de l'écoulement (▪▪▬) apparaisse.
Assurez-vous que ce symbole soit bien aligné avec le pointeur de dose.

Tenez le stylo avec la pointe de l'aiguille vers le haut.

Appuyez sur le bouton de dose et maintenez-le enfoncé jusqu'à ce que le compteur de dose revienne à ▸0◂.
Le ▸0◂ doit être aligné avec le pointeur de dose.

Une goutte de solution doit apparaître à la pointe de l'aiguille. Cette goutte indique que le stylo est prêt à être utilisé. Si aucune goutte n'apparaît, contrôlez une nouvelle fois le débit. Ce contrôle ne peut être réalisé que deux fois.

S'il n'y a toujours pas de goutte, changez d'aiguille et contrôlez à nouveau le débit.

Si après cela aucune goutte n'apparaît, utilisez un stylo neuf.

3 Sélectionnez la dose prescrite.

Tournez le sélecteur de dose jusqu'à ce que le compteur de dose s'arrête et indique la dose prescrite par votre médecin.

La ligne en pointillés du compteur de dose vous permettra d'obtenir la dose. Vous entendrez un clic à chaque fois que vous tournez le sélectionneur de dose.
Ne comptez pas les clics du stylo.
Il émet un clic différent lorsque vous le tournez vers l'avant, l'arrière ou au delà de la dose prescrite.

Vous avez correctement sélectionné la dose lorsque la dose prescrite est alignée avec le pointeur de dose.

4 Choisissez et préparez le site d'injection.



Wegovy® doit être administré par injection sous la peau (injection sous-cutanée).

Choisissez le haut du bras (en cas d'injection par un aidant), la cuisse ou le ventre (à une distance de 5 cm du nombril).

Vous pouvez injecter dans la même zone du corps chaque semaine, mais veillez à ne pas piquer exactement au même endroit dans cette zone. Assurez-vous de changer de point d'injection à chaque fois pour éviter d'injecter au même endroit que la semaine précédente.
Ne vous faites pas l'injection autour des cicatrices ou dans des régions où la peau est rouge ou lésée.

5 Procédez à l'injection.

Tenez le stylo pour que vous puissiez voir le compteur de dose. Ne le couvrez pas avec vos doigts. Cela pourrait interrompre l'injection.

Insérez l'aiguille dans la peau.

Appuyez sur le bouton de dose et maintenez-le enfoncé jusqu'à ce que le compteur de dose revienne à zéro. Vous pourrez alors entendre ou ressentir un clic.

Maintenez la pression sur le bouton de dose avec l'aiguille dans la peau et comptez lentement jusqu'à 6.

Le ▸0◂ doit être aligné avec le pointeur de dose. Vous pouvez entendre ou ressentir un clic lorsque le compteur de dose revient à ▸0◂.

Retirez l'aiguille de la peau.
Si l'aiguille est retirée trop tôt, un jet de Wegovy® peut sortir de la pointe de l'aiguille et la dose entière ne serait pas administrée.

Si du sang apparaît au site d'injection, appuyez doucement sur la zone avec un coton pour arrêter le saignement. Une goutte de Wegovy® peut apparaître à la pointe de l'aiguille après l'injection. C'est normal et n'a aucun impact sur la dose.

6 Après l'injection.

RETIREZ L'AIGUILLE DU STYLO ET JETEZ-LA.



Placez la pointe de l'aiguille dans le capuchon extérieur sur une surface plane sans toucher l'aiguille ni le capuchon.
Une fois l'aiguille recouverte de son capuchon extérieur, poussez doucement sur le capuchon jusqu'au bout.



N'essayez jamais de remettre le capuchon intérieur sur l'aiguille car vous pourriez vous piquer avec l'aiguille.
Dévissez l'aiguille recouverte de son capuchon exterieur et jetez-la immédiatement avec précaution dans un collecteur d'aiguilles, qui est un DASRI *(voir chapitre IV « Elimination des déchets »)*.



Remettez le capuchon sur le stylo après chaque utilisation afin de protéger le produit qu'il contient de la lumière.
Conservez le stylo à une température < 30°C ou au réfrigérateur *(voir chapitre VIII « Questions fréquentes »)*.

Il est impératif d'éliminer l'aiguille immédiatement après chaque injection pour éviter d'utiliser des aiguilles bouchées, la contamination, les infections et une erreur de posologie. Ne conservez jamais le stylo avec l'aiguille connectée.

QUE FAIRE DU STYLO ?

Conservez le stylo à une température < 30°C ou au réfrigérateur (*voir le chapitre « Questions fréquentes » Comment conserver le stylo ?*)
Lorsque le stylo est vide, jetez-le sans aiguille dans le bac de tri. Jetez le capuchon du stylo et la boîte vide à la poubelle (dans le bac de tri), *voir le chapitre IV « Élimination des déchets ».*

NOTEZ LE JOUR, LA DATE ET LA ZONE DE L'INJECTION.

Après chaque injection, pensez à noter sur la boite du stylo :
- **le jour de la semaine** choisi pour l'injection, et
- **la date afin de vous assurez du nombre d'injections réalisé** et du nombre de doses restantes dans le stylo.

IV. ÉLIMINATION DES DÉCHETS

Où jeter l'aiguille et les différentes parties du stylo ?

Vous réalisez vous-même vos injections, attention : vous êtes responsable de l'élimination de vos déchets !

Boîte à aiguilles DASRI	Bac de tri	Pharmacie
L'aiguille recouverte de son capuchon externe	Les boites du stylo et des aiguilles, la languette en papier de l'aiguille, la notice, le stylo vide (sans médicament) et son capuchon	Le stylo non vide (avec médicament)

Qu'est-ce que les DASRI ?
Certains de vos déchets présentent un risque pour vous-même et pour toute autre personne susceptible d'entrer en contact avec. On appelle ainsi DASRI les Déchets d'Activité de Soins à Risques Infectieux. Ils incluent les aiguilles et tout matériel piquant, coupant ou perforant potentiellement contaminés par des agents biologiques pathogènes représentant alors un risque d'infection. Dans le cadre de votre traitement en auto-injection, vous devez vous munir de boîtes à aiguilles (ou collecteurs) pour vous aider à éliminer comme il se doit les seringues et aiguilles usagées.

En aucun cas les DASRI ne doivent être mélangés et jetés avec les ordures ménagères. Seuls le cotons, lingettes antiseptiques et autres fournitures peuvent être jetés à la poubelle.

COMMENT SE PROCURER CES BOÎTES À AIGUILLES ?

- Ces boîtes à aiguilles peuvent vous être remises gratuitement, dans les pharmacies de ville ou d'établissement de santé (PUI = Pharmacie à usage intérieur), sur présentation de votre ordonnance.

COMMENT UTILISER LES BOÎTES À AIGUILLES ?

- Rangez les boîtes à aiguilles hors de portée des enfants.
- Ne pas remplir la boîte à aiguilles au-delà du trait supérieur.
- Fermez la boîte à aiguilles définitivement avant élimination.
- Le délai de stockage de la boîte à aiguilles ne doit pas dépasser 3 mois.

OÙ FAUT-IL RAPPORTER LES BOÎTES À AIGUILLES ?

- Rapportez la boîte à aiguilles fermée à un point de collecte.
- Pour connaître les points de collecte les plus proches, renseignez-vous auprès de votre pharmacien/médecin, de votre mairie, sur le site internet : http://dastri.fr/nous-collectons

V. INFORMATIONS **IMPORTANTES**

- **Injectez une seule dose de Wegovy® une fois par semaine.**
  Si vous ne suivez pas la prescription de votre médecin, vous pourriez ne pas bénéficier de tous les avantages du médicament.
- Si vous prenez plusieurs médicaments par injection, il est très **important de vérifier le nom et le dosage** sur l'étiquette du stylo avant utilisation.
- **N'utilisez pas ce stylo sans aide si vous avez des problèmes de vision et si vous n'êtes pas en mesure de suivre ces instructions.** Demandez de l'aide à une personne qui n'a pas de problème de vision et qui est formée à l'utilisation du stylo Wegovy®.
- Conservez toujours votre stylo et vos aiguilles **hors de la vue et de la portée des autres, en particulier des enfants.**
- **Ne partagez jamais** votre stylo ou vos aiguilles avec d'autres personnes.
- **Les aiguilles sont à usage unique. Eliminez l'aiguille d'injection après chaque injection** *(voir le chapitre IV « Élimination des déchets »)* **et conserver le stylo Wegovy® sans aiguilles d'injection. Ne réutilisez jamais vos aiguilles** pour éviter une occlusion de l'aiguille, une contamination, une infection, une fuite de solution ou une erreur de posologie.

VI. QUE FAIRE EN CAS D'EFFETS INDÉSIRABLES ?

Comme tous les médicaments, Wegovy® peut provoquer des effets indésirables, mais ils ne surviennent pas systématiquement chez tout le monde. Certains effets indésirables nécessitent une intervention rapide. Il est essentiel de surveiller attentivement votre état de santé et de savoir reconnaître ces symptômes pour agir rapidement et éviter des complications graves.

ARRÊTEZ le traitement et CONTACTER IMMÉDIATEMENT :
- le médecin qui vous a prescrit Wegovy®
- ou un autre médecin
- ou un service d'urgence (SAMU : 15 ; Service d'urgence : 112)

si vous développez un ou plusieurs des signes ou symptômes suivants :

Effet indésirable grave	Symptômes à reconnaitre	Conduite à tenir
Maladie de l'œil liée au diabète (rétinopathie).	**Problèmes au niveau des yeux, modifications de la vue :** Par exemple, la vision floue ou instable, diminution de la vision des couleurs, apparition de taches ou de zones sombres dans le champ visuel, perte soudaine de la vision.	Consultez **immédiatement un ophtalmologiste** et informez votre médecin.
Inflammation du pancréas (pancréatite aiguë).	Douleur intense et persistante au niveau de l'estomac, qui peut se déplacer dans le dos.	Consultez immédiatement un médecin.
Réactions allergiques sévères (réactions anaphylactiques, angioedème).	Difficultés respiratoires, gonflement, la tête qui tourne, battements de cœur rapides, de la transpiration et une perte de conscience ou un gonflement rapide du visage, de la gorge, des bras ou des jambes.	Demandez une **aide médicale en urgence** et informez votre médecin.
Obstruction de l'intestin.	**Constipation sévère, douleurs au niveau de l'estomac, ballonnements, vomissements.**	Consultez immédiatement un médecin.

Pour plus d'informations, consultez la rubrique 4, *« Quels sont les effets indésirables éventuels ? »* de la notice présente dans la boîte de votre médicament ou consultez la base de données publique des médicaments : http://base-donnees-publique.medicaments.gouv.fr

▼ **Ce médicament fait l'objet d'une surveillance supplémentaire qui permettra l'identification rapide de nouvelles informations relatives à la sécurité.**

Si vous ressentez un quelconque effet indésirable, parlez-en à votre médecin, pharmacien ou infirmier/ère. Vous pouvez également déclarer les effets indésirables directement via le portail de signalement des évènements sanitaires indésirables du ministère chargé de la santé www.signalement.social-sante.gouv.fr.

VII. PLANNING DES INJECTIONS

Votre traitement commencera à une faible dose qui sera progressivement augmentée.

Jour de la semaine choisi pour effectuer l'injection

1er MOIS

☐ 0,25 mg ☐ 0,5 mg ☐ 1,0 mg ☐ 1,7 mg ☐ 2,4 mg

J'ai injecté ma dose **à prendre chaque semaine** aux dates suivantes :

2ème MOIS

☐ 0,25 mg ☐ 0,5 mg ☐ 1,0 mg ☐ 1,7 mg ☐ 2,4 mg

J'ai injecté ma dose **à prendre chaque semaine** aux dates suivantes :

3ème MOIS

☐ 0,25 mg ☐ 0,5 mg ☐ 1,0 mg ☐ 1,7 mg ☐ 2,4 mg

J'ai injecté ma dose **à prendre chaque semaine** aux dates suivantes :

4ème MOIS

☐ 0,25 mg ☐ 0,5 mg ☐ 1,0 mg ☐ 1,7 mg ☐ 2,4 mg

J'ai injecté ma dose **à prendre chaque semaine** aux dates suivantes :

5ème MOIS

☐ 0,25 mg ☐ 0,5 mg ☐ 1,0 mg ☐ 1,7 mg ☐ 2,4 mg

J'ai injecté ma dose **à prendre chaque semaine** aux dates suivantes :

6ème MOIS

☐ 0,25 mg ☐ 0,5 mg ☐ 1,0 mg ☐ 1,7 mg ☐ 2,4 mg

J'ai injecté ma dose **à prendre chaque semaine** aux dates suivantes :

VII. PLANNING DES INJECTIONS

Votre traitement commencera à une faible dose qui sera progressivement augmentée.

Jour de la semaine choisi pour effectuer l'injection

7ème MOIS

☐ 0,25 mg ☐ 0,5 mg ☐ 1,0 mg ☐ 1,7 mg ☐ 2,4 mg

J'ai injecté ma dose **à prendre chaque semaine** aux dates suivantes :

8ème MOIS

☐ 0,25 mg ☐ 0,5 mg ☐ 1,0 mg ☐ 1,7 mg ☐ 2,4 mg

J'ai injecté ma dose **à prendre chaque semaine** aux dates suivantes :

9ème MOIS

☐ 0,25 mg ☐ 0,5 mg ☐ 1,0 mg ☐ 1,7 mg ☐ 2,4 mg

J'ai injecté ma dose **à prendre chaque semaine** aux dates suivantes :

10ème MOIS

☐ 0,25 mg ☐ 0,5 mg ☐ 1,0 mg ☐ 1,7 mg ☐ 2,4 mg

J'ai injecté ma dose **à prendre chaque semaine** aux dates suivantes :

11ème MOIS

☐ 0,25 mg ☐ 0,5 mg ☐ 1,0 mg ☐ 1,7 mg ☐ 2,4 mg

J'ai injecté ma dose **à prendre chaque semaine** aux dates suivantes :

12ème MOIS

☐ 0,25 mg ☐ 0,5 mg ☐ 1,0 mg ☐ 1,7 mg ☐ 2,4 mg

J'ai injecté ma dose **à prendre chaque semaine** aux dates suivantes :

VII. PLANNING DES INJECTIONS

Votre traitement commencera à une faible dose qui sera progressivement augmentée.

Jour de la semaine choisi pour effectuer l'injection

13ème MOIS

☐ 0,25 mg ☐ 0,5 mg ☐ 1,0 mg ☐ 1,7 mg ☐ 2,4 mg

J'ai injecté ma dose **à prendre chaque semaine** aux dates suivantes :

14ème MOIS

☐ 0,25 mg ☐ 0,5 mg ☐ 1,0 mg ☐ 1,7 mg ☐ 2,4 mg

J'ai injecté ma dose **à prendre chaque semaine** aux dates suivantes :

15ème MOIS

☐ 0,25 mg ☐ 0,5 mg ☐ 1,0 mg ☐ 1,7 mg ☐ 2,4 mg

J'ai injecté ma dose **à prendre chaque semaine** aux dates suivantes :

16ème MOIS

☐ 0,25 mg ☐ 0,5 mg ☐ 1,0 mg ☐ 1,7 mg ☐ 2,4 mg

J'ai injecté ma dose **à prendre chaque semaine** aux dates suivantes :

17ème MOIS

☐ 0,25 mg ☐ 0,5 mg ☐ 1,0 mg ☐ 1,7 mg ☐ 2,4 mg

J'ai injecté ma dose **à prendre chaque semaine** aux dates suivantes :

18ème MOIS

☐ 0,25 mg ☐ 0,5 mg ☐ 1,0 mg ☐ 1,7 mg ☐ 2,4 mg

J'ai injecté ma dose **à prendre chaque semaine** aux dates suivantes :

VIII. QUESTIONS FRÉQUENTES

Que faire en cas d'oubli d'une injection Wegovy® ?

Si vous avez oublié d'injecter une dose et que vous vous en rendez compte :

Dans les 5 jours qui suivent la date de l'injection oubliée :
injectez la dose dès que vous y pensez, puis injectez la dose suivante comme d'habitude, le jour prévu.

Après les 5 jours qui suivent la date de l'injection oubliée :
ne prenez pas la dose manquée. Injectez la dose suivante comme d'habitude, le jour prévu.

Important :
- Ne jamais prendre de dose double pour compenser une dose oubliée.
- Consultez votre médecin avant d'arrêter le traitement.

Pour toute question, demandez plus d'informations à votre médecin, pharmacien ou infirmier/ère.

Que faire si j'ai utilisé plus de Wegovy® que je n'aurais dû ?

Prévenez immédiatement votre médecin. Vous pouvez avoir des effets indésirables tels que des nausées, des vomissements ou de des diarrhées, qui peuvent provoquer une déshydratation (perte de liquides).

La quantité de Wegovy® est-elle suffisante ?

Si le compteur de dose s'arrête avant que vous n'atteigniez la dose prescrite, il n'y a plus assez de Wegovy® pour obtenir une dose complète. **Eliminez le stylo et utilisez-en un nouveau.**

Comment bien entretenir le stylo ?

Pour bien entretenir votre stylo Wegovy®, suivez ces instructions afin de garantir son bon fonctionnement et éviter les erreurs de dosage qui pourraient réduire l'efficacité du traitement :

- Conservez le stylo en **respectant les conditions de conservation recommandées.**
- **N'exposez pas le stylo** à la lumière directe du soleil.

- **Ne congelez jamais** Wegovy® et n'utilisez pas le stylo s'il a été congelé.
- **Manipulez le stylo avec soin :** ne le laissez pas tomber et ne le cognez pas sur des surfaces dures.
- **Évitez d'exposer** le stylo à la poussière, à la saleté ou à des liquides.
- **Ne lavez pas le stylo et ne le faites pas tremper.** Pour le nettoyer, utilisez un chiffon humide avec un détergent doux si nécessaire, sans appliquer de lubrifiant.

Comment conserver le stylo Wegovy® ?

AVANT OUVERTURE

- Conservez-le au réfrigerateur entre 2°C et 8°C.
- Maintenez le à distance de l'élément de refroidissement.
- Toujours conserver dans l'emballage d'origine à l'abri de la lumière

- Ne pas congeler et ne pas l'utiliser s'il a été congelé.

APRÈS OUVERTURE

Durée de conservation 6 semaines

- À une température < 30 °C.
- Ou au réfrigérateur entre 2 et 8 °C.
- Ne pas congeler et ne pas l'utiliser s'il a été congelé.
- Lorsque vous n'utilisez pas le stylo, laisser le capuchon du stylo en place pour le protéger de la lumière.

Comment savoir si l'aiguille de mon stylo Wegovy® est bouchée ou endommagée ?

Si ▸0◂ n'apparaît pas dans le compteur de dose après avoir appuyé en continu sur le bouton de dose, il est possible que vous ayez utilisé une aiguille bouchée ou endommagée.

Dans ce cas, vous n'avez pas reçu Wegovy®, même si le compteur de dose n'est plus sur la dose initiale que vous aviez définie.

En cas d'aiguille bouchée, changez-la conformément aux instructions données dans la présente brochure *(voir chapitre III « Instructions pour l'administration »).*

Si vous ressentez un quelconque effet indésirable,
parlez-en à votre médecin, pharmacien ou infirmier/ère.

Vous pouvez également déclarer les effets indésirables directement via
le portail de signalement des évènements sanitaires indésirables du ministère
chargé de la santé www.signalement-sante.gouv.fr.

Pour plus d'information, veuillez consulter la notice dans la boîte de
votre médicament ou sur la base de données publique des médicaments :
http://base-donnees-publique.medicaments.gouv.fr.

Pour toute demande d'information concernant nos produits ou services,
vous pouvez contacter le service d'information médicale de Novo Nordisk
du lundi au vendredi de 8h à 18h.

0 800 803 070 **Service & appels gratuits**

Depuis les DROM-COM, vous pouvez nous joindre au 01 41 97 65 00.
Appel gratuit depuis un poste fixe.

novo nordisk®